


Herzinsuffizienz - Diagnosealgorithmus



Empfohlene diagnostische Tests bei Verdacht auf HI

- BNP/NT-proBNP (I, B)
- 12-Kanal EKG (I, C)
- Transthorakale Echokardiografie (I, C)
- Thoraxröntgen (I, C)
- Routine-Blutuntersuchungen auf Komorbiditäten, einschließlich großes BB, Harnstoff und Elektrolyte, Schilddrüsenfunktion, Nüchtern glukose und HbA1c, Lipide, Eisenstatus (TSAT und Ferritin) (I, C)

BNP: B-Typ natriuretisches Peptid

EKG: Elektrokardiogramm

HFmrEF: Heart failure with mildly reduced ejection fraction/Herzinsuffizienz mit mäßiggradig eingeschränkter linksventrikulärer Ejektionsfraktion

HFpEF: Heart failure with preserved ejection fraction/Herzinsuffizienz mit erhaltener systolischer linksventrikulärer Funktion

HFrEF: Heart failure with reduced ejection fraction/Herzinsuffizienz mit reduzierter linksventrikulärer Ejektionsfraktion

HI: Herzinsuffizienz

LVEF: Linksventrikuläre Ejektionsfraktion

NT-proBNP: N-terminales pro B-Typ natriuretisches Peptid

Zur vollständigen Guideline →



**Boehringer
Ingelheim**

Anzeige