medbee guideline-fit

Herzinsuffizienz -Symptome und Zeichen

Typische Symptome

- Atemlosigkeit
- Orthopnoe
- Paroxysmale nächtliche Dyspnoe
- Reduzierte Belastungstoleranz
- Fatigue, Schläfrigkeit, Regenerationszeit nach Belastung erhöht
- Knöchelschwellung

Weniger typische Symptome

- Nächtlicher Husten
- · Wheezing/Giemen
- Völlegefühl
- Appetitlosigkeit
- Verwirrung (insbes. bei älteren Menschen)
- Depression
- Herzklopfen
- Schwindel
- Synkope
- Bendopnoe^a

Spezifischere Anzeichen

- Erhöhter Jugularvenendruck
- Hepatojugulärer Reflux
- 3. Herzton (Galopprhythmus)
- Seitlich verschobener apikaler Impuls

Weniger spezifischere Anzeichen

- Gewichtszunahme (> 2kg/Wo)
- Gewichtsverlust (fortgeschrittene HI)
- Gewebeschwund (Kachexie)
- Herzgeräusch
- Peripheres ÖdemLungenkrepitationen
- Pleuraerguss
- Tachykardie
- ' lacilykalule
- Unregelmäßiger Puls
- Tachypnoe
- Cheyne-Stokes-Atmung
- Hepatomegalie
- Aszites
- Kalte ExtremitätenOligurie
- Niedria
- Niedriger Pulsdruck

Anmerkungen:

^a Dyspnoe beim Herunterbeugen

HI: Herzinsuffizienz

Anzeige



Zur vollständigen Guideline →